

Syrup Hepatovet

Vitamin enriched herbal liver tonic

সিরাপ হেপাটোভেট ভিটামিন সমৃদ্ধ ভেষজ লিভার টনিক

Only for the use of animals

শুধুমাত্র পশু চিকিৎসায়

Animal nutritional liquid feed premix

Composition

Each 100 ml contains *Aphanamixis polystachya* 200 mg, *Terminalia chebula* 400 mg, *Rheum emodi* 250 mg, *Andrographis paniculata* 2000 mg, *Berberis aristata* 400 mg & other herbal ingredients and Vitamin B₁ 15 mg, Vitamin B₂ 5.8 mg, Nicotinamide 84 mg, Vitamin B₁₂ 10 mcg, Inositol 200 mg, Choline bitartrate 5 mg.

Pharmacology

Aphanamixis polystachya: Hepatoprotective, Antiviral & Anti-bacterial.

Terminalia chebula: Used for the treatment of extended liver.

Rheum emodi: Used for the treatment of jaundice.

Andrographis paniculata: Anti-infective.

Berberis aristata: Anti hepatitis & anti-infective.

Thiamin HCl BP: Helps carbohydrate, protein & fat metabolism.

Riboflavin: Helps carbohydrate, protein & fat metabolism.

Nicotinamide BP: Helps in the synthesis of amino acid & CHO metabolism.

Cyanocobalamine BP: Helps carbohydrate, protein & fat metabolism.

Inositol BP: Prevents fatty liver syndrome.

Choline bitartrate BP: Prevents fatty liver syndrome.

Indications

- Mycotoxicosis
- Fatty liver syndrome
- During & after treatment with antibiotic/Chemotherapeutic or anthelmintics.
- Digestive disorders
- To increase FCR & in stress.

Dosage and Administrations

Only for the use of animal/poultry feed

For oral administration only.

Livestock: 20-40 ml/animal daily for 10-15 days orally. Dosages can be extended as needed.

Poultry: 1ml/L drinking water. Or for 100 birds: Chicks 5 ml, grower 10 ml and finisher 20 ml daily.

Hepatovet should be used for 7 days each month in morning water and treatment can be extended as needed.

Or as directed by the registered Veterinarian.

Contraindication

Not known.

Warning & Precautions

Shake well before use.

Side Effects

No side effects were observed at the recommended doses.

Use in Pregnancy & Lactation

Safe in pregnancy and lactation.

Drug Interactions

With medicine: None

With feed and others: None

Overdose

Not known.

Withdrawal Time

Meat, Milk & Eggs: 0 (Zero) days.

Storage

Store below 30°C temperature and dry place, protected from light. Keep out of reach of children.

Packing

100 ml, 500 ml, 1 Liter & 3 L

পশুখাদ্যের তরল পুষ্টি প্রিমিক্স

উপাদান

প্রতি ১০০ মি.লি. এ রয়েছে আফনামিক্সিস পলিস্টাচিয়া ২০০ মি. গ্রা., টারমিনালিয়া চেবুলা ৪০০ মি. গ্রা., রিয়াম এমোডি ২৫০ মি. গ্রা., এনড্রোগ্রাফিস পেনিকুলাটা ২০০০ মি. গ্রা., বারবেরিস এরিসটাটা ৪০০ মি. গ্রা. ও অন্যান্য ভেষজ উপাদান এবং ভিটামিন বি_১ ১৫ মি. গ্রা., ভিটামিন বি_২ ৫.৮ মি. গ্রা., নিকোটিনামাইড ৮৪ মি. গ্রা., ভিটামিন বি_{১২} ১০ মা. গ্রা., ইনোসিটল ২০০ মি. গ্রা., কোলিন বাইটারট্রেট ৫ মি. গ্রা।

ফার্মাকোলজি

আফনামিক্সিস পলিস্টাচিয়া: হেপাটোপ্রোটেক্টিভ, এন্টিভাইরাল ও এন্টিব্যাকটেরিয়াল।

টারমিনালিয়া চেবুলা: সম্প্রসারিত যকৃতের চিকিৎসায় কার্যকর।

রিয়াম এমোডি: জন্ডিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

এনড্রোগ্রাফিস পেনিকুলাটা: সংক্রামক বিরোধী।

বারবেরিস এরিসটাটা: হেপাটাইটিস প্রতিরোধী এবং সংক্রামক প্রতিরোধক।

ভিটামিন বি_১: কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বি বিপাকে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি_২: কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বি বিপাকে সাহায্য করে।

নিকোটিনামাইড: অ্যামাইনো এসিড এবং কার্বোহাইড্রেট বিপাক সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি_{১২}: কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বি বিপাকে সাহায্য করে।

ইনোসিটল বিপি: ফ্যাটি লিভার সিন্ড্রোম প্রতিরোধ করে।

কোলিন বাইটারট্রেট বিপি: ফ্যাটি লিভার সিন্ড্রোম প্রতিরোধ করে।

নির্দেশনা

- মাইকোটক্সিকোসিস
- ফ্যাটি লিভার সিন্ড্রোম
- অ্যান্টিবায়োটিক/কেমোথেরাপিউটিক বা কুমিন্শক সাথে চিকিৎসার পূর্বে এবং পরে।
- পাকস্থলীয় রোগ
- এফসিআর উন্নীতকরণে।

প্রয়োগমাত্রা ও প্রয়োগবিধি

শুধুমাত্র পশুখাদ্য/পোল্ট্রিখাদ্যে ব্যবহারের জন্য

শুধুমাত্র মুখে খাওয়ানোর জন্য

গবাদি পশু

প্রতিটি গবাদি পশুকে ২০-৪০ মি.লি. করে দিনে ১ বার ১০-১৫ দিন, প্রয়োজনে চিকিৎসার

মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

পোল্ট্রি

সাধারণত ১ মি.লি./লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। অথবা প্রতিদিন ১০০ টির

জন্য: হাঁস-মুরগীর বাচ্চা: ৫ মি.লি., গ্ৰোয়ার: ১০ মি.লি., লেয়ার/ব্রয়লার ফিনিশার: ২০ মি.লি.।

হেপাটোভেট সকালের পানিতে মিশিয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৭ দিন খাওয়াতে হবে।

প্রয়োজনে চিকিৎসার মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনা

জানা যায় নি।

সাবধানতা ও সতর্কতা

ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

নির্ধারিত মাত্রায় কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী পশুতে ব্যবহার নিরাপদ।

ঔষধের মিথস্ক্রিয়া

ঔষধের সাথে: নেই।

খাবার ও অন্যান্যের সাথে: জানা যায় নি।

মাত্রাধিক্য

জানা যায় নি।

প্রত্যাহারকাল

মাংস, দুধ ও ডিম: ০ (শূন্য) দিন।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ৩০°C সে তাপমাত্রার নিচে এবং শুষ্ক স্থানে রাখুন।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

মোড়কজাতকরণ

১০০ মি.লি., ৫০০ মি.লি., ১লিটার ও ৩ লিটার।



Manufactured by

The ACME Laboratories Ltd.

Veterinary Division

Dhulivita, Dhamrai, Dhaka, Bangladesh



প্রস্তুতকারক

ডি এক্স ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড

ভেটেরিনারি বিভাগ

হুপিটা, গমরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ