

WSP  
**IRB 800**

Probiotics, Amino acid, Enhancing agents,  
trace mineral & Stabilizers

For aquaculture use only.

**Composition:** Each 50 g contains Bacillus spp. 4.0 x 10<sup>8</sup> CFU, Bentonite 46.075%, Sodium Silico Alluminate 46.075%, Thiobacillus ferrooxidans 5.460%, Propylene Glycol 0.800%, Molasses 0.144%, Acetic acid 0.100%, Plants Protein products 0.030%, Lactic acid 0.020%, Dicalcium phosphate 0.010%, Sodium bicarbonate 0.010%, Magnesium Sulfate 0.006%, Potassium Chloride 0.005%, Copper sulfate 0.001%, Selenium 0.001%, Zinc Sulfate 0.001%, Sodium Benzoate 0.001% & Potassium Sorbate 0.001%.

**Indication:**

- It is indicated for removing excess iron pyrite contamination from aquaculture pond.

**Dosage and Administration:**

Pond preparation: 500 g/Hectare

Pond maintenance: 150 g/Hectare/Week

Or, as directed by an aqua expert.

**Drug Interaction:** Not known.

**Withdrawal Period:** Not known.

**Storage:** Store in a cool & dry place, protected from light. Keep all medicine out of reach of children.

**Presentation:** 1 L.

**Marketed by**



The **ACME** Laboratories Ltd.

Veterinary Division  
Dhamrai, Dhaka, Bangladesh.



ডব্লিউএসপি

**আইআরবি-৮০০**

প্রোবায়োটিক, অ্যামাইনো এসিড, ইনহ্যানসিং এজেন্ট,  
ট্রেস মিনারেল ও স্ট্যাবিলাইজার

শুধুমাত্র মৎস্য চাষে ব্যবহার্য।

**উপাদান:** প্রতি ৫০ গ্রাম পাউডার এ রয়েছে ব্যাসিলাস প্রজাতি ৪ x ১০<sup>৮</sup> সিএফইউ, বেন্টোনাইট ৪৬.০৭%, সোডিয়াম-সিলিকো-অ্যালুমিনেট ৪৬.০৭৫%, থায়োব্যাসিলাস ফেরোক্সিডেস ৫.৪৬%, প্রোপাইলিন গ্লাইকল ০.৮০%, মোলাসেস ০.১৪৪%, এসিটিক এসিড ০.১০%, উড্ডিড প্রোটিন ০.০৩%, ল্যাকটিক এসিড ০.০২০%, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট ০.০১%, সোডিয়াম-বাই কার্বোনেট ০.০১%, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ০.০০৬%, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ০.০০৫%, কপার সালফেট ০.০০১%, সেলেনিয়াম ০.০০১%, জিংক সালফেট ০.০০১%, সোডিয়াম বেনজোয়েট ০.০০১% ও পটাসিয়াম সর্বেট ০.০১%।

**নির্দেশনা:**

পুকুরের লাল স্তর দূর করে

**প্রয়োগমাত্রা ও প্রয়োগবিধি :**

পুকুর/ঘের প্রস্তুতিতে (কম ঘনত্বের লাল স্তর দূরীকরণে): ৬৭ গ্রাম/৩৩ শতাংশ।

চাষের সময় (১ম ডোজ): ২০ গ্রাম/৩৩ শতাংশ।

চাষের সময় (২য় ডোজ): (এক সপ্তাহ পরে) ৪০ গ্রাম/৩৩ শতাংশ।

প্রয়োগবিধি: প্রয়োজনীয় পরিমাণ আইআরবি ৮০০ ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুর/ঘেরে মাত্রা

অনুষায়ী খুব সকালে প্রয়োগ করতে হবে। অথবা, মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**প্রত্যাহারকাল:** জানা যায়নি।

**সংরক্ষণ:** আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

**সরবরাহ:** ৫০ গ্রাম।

**বাজারজাতকরণ**



দি একান্ন ল্যাবরেটরিজ লিঃ

ভেটেরিনারি বিভাগ  
ধামরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ

